

醫心方卷第十

從五位下行鍼博士魚丹波介丹波宿祢康賴撰

治積聚^{しやろいし}方第一

治諸^{イタハラ}疝方第二

治七^{イタハラ}疝方第三

治寒疝方第四

治八^{イタハラ}疝方第五

治癰^{イタハラ}疝方第六

治果癰方第七

治蛇癰方第八

治鼈癰方第九

治臭癰方第十

治宗癰方第十一

治駁癰方第十二

治米癰^{イタハラ}方第十三

治水癰方第十四

治食癰^{イタハラ}方第十五

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治積聚方第一

治諸疝方第二

治七疝方第三

治寒疝方第四

治八疝方第五

治癰疽方第六

治果癰方第七

治蛇癰方第八

治蠃癰方第九

治臭癰方第十

治宗癰方第十一

治駃癰方第十二

治米癰方第十三

治水癰方第十四

治食癰方第十五

治酒癰方第十六

水病證候第十七

治大腹水腫方第十八

治通身水腫方第十九

治十水腫方第二十

治風水腫方第二十一

治水癰方第二十二

治身面癰方第二十三

治疔腫方第二十四

治黃疽方第二十五

治黃汗方第二十六

治穀疽方第二十七

治酒疽方第二十八

治女勞疽方第二十九

治黑疽方第三十

治積聚方第一

病源論云積聚者由陰陽不和府藏虛弱受於風

邪搏於府藏之氣所為也府者陽也藏者陰也陽

浮而動陰沉而伏積者陰氣五藏所生始發不離

其部故上下有窮也聚者陽氣六府所成故無

根本上下無所留心其痛無有常處肝之積名曰肥

氣在左脇下如覆杯有頭足令人發瘡心之積名曰伏

梁起脊上如臂上至心下脾之積名曰痞氣在胃管覆

大如盤令人四支不收黃疸飲食不為肌膚肺之

積名曰息賁在右脇下覆大如杯令人洒淅寒熱腎

之積名曰贲然發於少腹上至心下若死賁之狀上下無

時令人喘逆骨萎少氣繫門方云辨曰肥氣者肥盛

也言肥氣如覆杯突出如肥盛之狀伏梁者言其大如臂

狀似屋舍梁棟也故名伏梁痞者滿也言其氣滿痞結

成積也息者長也奔者羣也言其氣漸長而通於

積名曰息責在右脇下覆大如坏令人洒淅寒熱腎

之積名曰貫牝發於少腹上至心下若牝責之狀上下無

時今人謂連骨萎少氣鑿門方云辨曰肥氣者肥盛

也言肥氣如覆坏突出如牝盛之狀伏梁者言其大如臂

狀似屋舍梁棟也故名伏梁痞者滿也言其氣滿痞結

成積也息者長也奔者羣也言其氣漸長而適於

羣故曰息奔病似伏豚而上衝心者也又有奔豚之氣非

積病也名同而病異焉華他方云貳車丸常在尊者

後軍故名二車丸主心腹衆病羣上積聚寒熱食飲

不消或憂悲喜怒或從勞倦氣結或有故疾氣

浮有上飲食衰少不生肌害若辟在脇吞一九

常消若驚恐不安吞一九日三獨卧不恐病劇晝

日六七夜三吞薇者晝日四五夜每吞寒痺隨利

去令人善米氣又治女子絕產少腹苦痛得陽

氣痛之引胸中積寒所致風入子道或月經未

絕而合陰陽或急欲溺而合陰陽或衣未捺

而合陰陽或急便著之濕從下上久作長病

吞藥如上百日有子貳車丸方

蜀椒成擇一斤乾薑大小相稱廿枚粳米一升

朗陵烏頭大小相稱廿枚鉞電中灰一升

凡五物以水一斗半漬灰練囊中盛半絞結

內灰中一宿暴乾之皆未諸藥下篩和以蜜唾

吞如梧子丸勿用漿水也身中當痺藥

力盡乃食老小裁之

范江方五通丸主積聚留飲宿食寒熱煩結長肥

膚補不足方

凡五物以水一斗半漬灰練囊中盛半絞結
內灰中一宿暴乾之皆未諸藥下篩和以蜜唾
吞如梧子丸勿用漿水也身中當痺藥
力盡乃食老子載之

范汪方五通丸主積聚留飲宿食寒熱煩結長肥
膚補不足方

枳實一兩行 附子一兩炮 厚朴一兩炙 杏仁三兩炙
半夏一兩洗 亭歷三兩一名消石 芒消五兩一名消石 大黃九兩炙
凡八物別搗亭歷杏仁使就合和諸藥末
使調和以蜜搗五千杵吞必梧子二丸

又玄三合丸主五藏寒熱積聚臃脹腹大空鳴而意食不
生肌膚利者欬逆若傷寒病已愈新食不殺飯已吞
五丸飲多吞十九取大便秘利長客氣補不足可常

心腹方

大黃十二兩一方二兩推碎 亭歷一升炙令變色 附子一兩炙令變色
杏仁一升炙令變色 消石一升一方前胡 厚朴一兩炙 伏苓半兩
凡十物皆搗篩以蜜搗三万杵丸如梧子從

五丸起不知稍增取大便秘利為度

天云治久寒積聚方 虎杖根一升許搗之以酒漬日三

飲一升

小品方玄七氣丸治七氣為病有寒氣怒氣喜氣憂氣
患氣愁氣熱氣此七氣為病皆生積聚堅牢如坏
在腹中心痛煩悶不能食時來發作有時發
痛欲絕也其寒氣則吐逆心下脹滿其熱氣則恍惚悶

亂常如眩冒失精其怒氣則不可當熱病上過心短氣
次色不身息其患氣則責氣心下不得食其憂氣

飲一升

小品方云七氣丸治七氣。七氣為病。皆主積聚。堅牢如坏。
患氣。愁氣。熱氣。此七氣為病。皆主積聚。堅牢如坏。
在腹中心痛煩。不能食。時來發作。有時發。
痛欲絕也。其寒氣則。迷心下脹滿。其熱氣則。恍惚悶。
亂。常如眩。目失精。其怒氣則。不可當。熱病上。過心短氣。
欲絕。不得息。其患氣則。積聚心下。不得食。飲其毒氣。
則不可疾行。久立。其憂氣則。不可苦作。卧不安。席其愁。
氣。怒。憂。物四傍。不復憶。處四支。手足跗腫。不得舉。
三治產。生早起。中風餘疾也。

大黃十分 人參二分 枳二分 半夏三分

烏頭五分 桔梗三分 細辛三分 萊菔三分

于薑三分 菖蒲三分 伏苓三分 芍藥分

紫苑三分 其草三分 石膏三分 莢胡三分 桃人分

凡十七物。治合下。肺和以蜜。酒服。如松子三丸。日三。不知稍。
增。以知至十九丸為度。
今案錄驗方有桂心。元蜀椒。治宿寒積聚。未滿諸。
毒氣。結迷氣。腹中結。如石。令人。強。身。壯。澤。

千金方七氣湯。治憂氣。氣。勞氣。寒氣。愁氣。或飲食為。
氣。高氣。或虛勞。內傷。五藏。不調。陽氣。衰。以。迷。上下。方。

甘草兩 枳樓二兩 夕藥二兩 枳三兩 半夏二兩

人參兩 于地黃二兩 萊菔五兩 八味切以水一斗

煮取三升。分三服。

又云神明度命丸。治久病。腹內積聚。大小便不通。氣上。
搶胸。腹中脹滿。逆若飲食。服之甚良方。大黃一兩。

夕藥一兩 二味蜜丸。如梧子。服四丸。日二。不知可增至。
六七丸。以和為度。又云。脇下。即氣積聚。往來寒熱。

知濕瘧方。莖鼠壤土。製之。令即易。

葛代方。云。露音丸。治大寒。冷。積聚。方。石。于薑。

查取三升分三服

又云神明度命丸治久病腹內積聚大小便不通氣上
搶胸腹中脹滿逆若飲食服之甚良方 大黃一兩

夕藥一兩 二味蜜丸如梧子服四九日二不知可增至

六七九以和為度又云脇下即氣積聚往來寒熱

知濕瘧方 蓬蘽壞土製之令即易

葛氏方玄露宿丸治大寒冷積聚方 礬石于薑

桂桔梗附子皂莢各三兩

搗篩蜜丸服如梧子十九日三稍增至十五丸

僧深方治心下支滿痛破積聚欬逆不受食寒熱喜嘔

方 蜀椒五分 于薑五分 桂心五分 烏頭五分

石心物治合下痞蜜和丸如小豆先鋪食以米汁服

一丸日三夜一不知積增一丸以知為度禁食飲

新錄方治積聚方 馬莧搗汁為煎令可丸消脹久

素日三

德貞常方積聚方 灸第十一推節下間相去三寸

又方灸上管穴在鳩尾下二寸又方灸胃管穴在上管下

一寸又方灸水分穴在臍上寸 新羅法師方

續徒子皆上以酒一合和而服之二七粒量久老少

用之崔禹錫食經 取蔓菁子一升搗研以水三升煮取一

升濃服之為藥也止治癥瘕也 治諸病方第二

病源論云陰氣積於內復為寒氣無故故使榮衛不調

血氣虛弱故風冷入其腹內而成病也病者痛也成少腹

痛不得大小便或年之厥冷繞脊痛曰汗出或冷氣逆

上搶心腹冷心痛或裏急而嘔痛此諸候非一故云諸

病也八十一難云五藏謂之病六府謂之度又曰男病謂

之病女病謂之度 葛氏方治卒得諸病少腹及陰中

升濃脹之為藥也。治諸病方第二

病源論云：陰氣積於內，復為寒氣，無故故使榮衛不調。

血氣虛弱，故風冷入其腹內，而成疝也。疝者，痛也。成少腹

痛，不得大小便，或干之厥冷，繞脊痛，曰汗出，或冷氣逆

上，搶心腹，冷心，痛或裏急而腸痛，此諸候非一，故云諸

疝也。八十一難云：五藏謂之疝，六府謂之瘕。又曰：男病謂

之疝，女病謂之瘕。葛氏方治率得諸病，少腹及陰中

相引痛，如絞，白汗，欲死方。搗沙參下篩，以酒服方

寸匕，立愈。又方：楸二合，干薑四兩，水四煮，取二升，去滓

內，枳一斤，又煎取半升，分再服。又方可服諸利

丸下之作，走馬湯三佳。又方：灸心鳩尾下一寸，名

關及左右各寸，無百壯。

要方療積：羊腹內宿結，疝令氣及諸瘕，瘳方香

義爛豕心一升。曝乾，薇煮令唯去石薇煮小芥子一升，令色黃。

石蜜丸，空腹酒服，十至五丸，如至世五丸，曰二服，初服半劑。

已來腹中覺絞痛，勿恠，此是攻病之候。

新錄方治諸疝方。桃白皮一升，以水三升，煮取一升，

煩服之。又方：酒服，薤黃二方寸匕，曰二

又方：搗桃人八十枚，去皮研如泥，酒下。又方：搗大蒜

為泥，酒服，如煮二枚，曰三范，注方治心，疝灸法，兩足

大指甲，本甲突之際，甲內各半，主隨羊壯。又方

灸足心及足大指甲後橫理節上，及大指歧間白黑肉際

百壯，則心。治七疝方第三。病源論云：七疝者，厥逆心痛，足寒清，飲食吐，不下，名

曰厥疝。腹中氣乍滿，心下盡痛，氣積如臂，名曰瘕

病。寒飲，昂脇下腹中盡痛，名曰寒疝。腹中乍滿，乍減

而痛，名曰氣疝。腹中痛在脊旁，名曰癰疝。腹中在脊

大指甲本甲寅之際甲內各半主隨羊法 又方

灸足心及足大指甲後橫理節上及大指政同白黑肉際

百壯則心 治七疝方第三

病源論云七疝者厥逆心痛之寒清飲食吐不下名

曰厥疝腹中氣乍滿心下盡痛氣積如臂名曰瘰

疝寒飲昂脇下腹中盡痛名曰寒疝腹中乍滿乍減

而痛名曰氣疝腹中痛在脊旁名曰盤疝腹中在脊

下有積聚名曰肘疝腹與陰相引而痛大行難名狼

疝也皆由血氣虛弱飲食寒溫不調之所生也

錄驗方七疝治人腹中有大疾厥逆心痛之寒食

吐不下名曰厥疝腹中氣滿心下盡痛氣積大如臂

名曰僻疝寒飲食昂脇下腹中盡痛名曰寒疝腹中乍滿乍

減而痛名曰氣疝腹中痛在脊左傍名曰盤疝腹痛脊

右下有積聚名曰附疝腹與陰相引而痛大行難名曰

狼疝治方

人參五分 桔梗五分 黃芩五分 細辛五分 干薑五分

蜀椒五分 當歸五分 芍藥五分 厚朴五分 烏頭五分

凡十物治下篩和以白蜜丸如梧子大食服四丸日三

不知稍增禁生臭猪宗 今案僧深方有八物桔梗細辛桂心芍

藥厚朴黃芩各一兩半蜀椒二兩半烏

頭二分合服三九日三范汪注方有十二物蜀椒五分干薑四分厚朴四分桔

梗二分烏頭一分黃芩四分細辛四分芍藥四分此胡一分伏苓一分枳

治寒疝方第四

病源論云陰氣積於內則衛氣不行衛氣不行則

寒盛故令惡寒不飲食手足厥冷繞脊痛白汗出遇

寒即發故云寒疝

葛氏方治寒疝去來每發絞痛方

吳茱萸三兩 生薑四兩 乾二合 酒四升

一分先補食以
清服七九日三

治寒病方第四

病源論云陰氣積於內則衛氣不行衛氣不行則
寒盛故令惡寒不飲食手足厥冷繞脊痛白汗出遇
寒即發故云寒病

葛氏方治寒病去來每發絞痛方

吳茱萸三兩 生薑四兩 豉二合 酒四升

煮取二升二服

小品方云解急蜀椒湯主寒病心痛如刺繞脊絞痛

腹中盡痛白汗自出欲絕方 蜀椒三百枚 一方二百枚

附子一枚 剉末半升 干薑半兩 大棗廿枚 半復十二枚

甘草一兩 凡七物以水七升煮取三升熱服一升不更服服升

一升注心方蜀椒湯治寒病腹痛奔豚方

吳茱萸升 當歸一兩 芍藥一兩 黃芩一兩

蜀椒二合 五味以水八升煮取二升半分三服

范汪方治寒病腹中痛小建胡湯方 苡胡半升

半夏半升 洗 黃芩三兩 甘草三兩 人參三兩

生薑三兩 大棗十二枚 凡七物以水一斗升煮得

六升去滓服一升日三

耆婆方治寒病積聚用力不節脈絕傷氣羸瘦不能
食飲此藥令人強健除冷氣痞丸方

烏頭廿分 炮 甘草八分 炙 真芍藥分 厚朴八分 熬

芍藥八分 大黃八分 右七味搗篩以蜜和為丸如

梧子服五丸日二忌猪臭五辛生冷酢滑

新錄方治寒病及衝心痛方 塩五合 竜安墨三合

以水一大升煮取一升半頓服之吐老

文方水一升合煮取一升五合交取一升服之方地人

食飲此藥令人強健除冷氣痞九方

烏頭廿分炮

甘草八分炙

真オキカ芎藭コウキウ分

亭歷テイリキ八分熬

芍藥セキヤク八分

大黃ダイカウ八分

右七味搗篩以蜜和為丸丸如ル

梧子コ脹五九日二忌猪臭五辛生冷酢滑

新錄方治寒疝及衝心痛方

鹽五合

竈突墨三合

以水一大升煮取一小升頓服之吐老

又方水一升合漬頭一升五合絞取汁服之方桃人

八十枚去皮研如泥酒下之又方桃白皮一升以水三升

煮取一升頓服之又方以水若酒服セ亂髮灰方寸匕

又方水清服伏龍肝方寸匕旦又方水服セ亂帶

蘇灰方寸匕旦又方酒五升燒廬角一枚投酒

中分二三服之又方灸乳下一寸是大指蒸毛

又方灸上三寸名大倉吞下三寸名丹田各五七至並

要穴又方灸上管七壯又方灸窮脊上寸百壯

又方灸脊中百壯治八痞方第五

病源論云榮衛不和陰陽障絕而風邪外入與衛氣

相搏ハキ血氣擁塞不通而否也否者塞也言府藏塞不

宣通也由憂恚氣積或墮墜內損所致其病腹內氣

結腹時滿壯熱是也其名有八故云八痞而方家不約其

證狀

八十一難云脾之積名曰痞氣在胃管覆之大如盤令

人四支不收言且莖黃疸言且飲食不為肌膚今案楊氏注云痞否也言

滿也言其氣滿痞結成積也錄驗方治八痞瘕香丸方

光明沙 麝香 丁香 曾青各二兩 大黃七合

黃芩三分 朴消兩 亭歷子六分 甘草一兩

巴豆六分 凡十物搗篩蜜丸如小豆一丸平旦空

腹脹若老人壯者同患之人脹如梧子一丸

八十一難云脾之積名曰痞氣在胃管覆之大如盤令人四支不收莖黃疸飲食不為肌膚今案楊氏注云痞不也言痞也言其氣滿痞結成積也錄驗方治八痞癥瘕香丸方

元明沙 麝香 丁香 曾青各兩一名空青 大黃七合

黃芩三分 朴消兩 亭脂子六分 甘草一兩

巴豆六分 凡十物搗篩蜜丸如小豆一丸平旦空

腹脹若老人壯者同患之人脹如梧子一丸

傳信方云療秋夏之交露坐夜久腹內如羣石在腹

中痛者方 大豆半升 生薑八分 右以水二升煎取

一升已下頓服其緊痞立散 治癥瘕方第六

病源論云癥瘕者皆由寒溫不調飲食不化與藏氣

相搏結所生也其不動移者直名為癥若病雖有結

聚而可推移者名為瘕也葛氏方云癥瘕病衝心不

殺動飲食痛者死 新錄方云治一切癥溫白丸方南

州刺史臣陰鏐言臣家慈澤視事三年自到任官

以來臣妻不使水土有地下濕遂得腹脹病頃年已

來恒遣醫治療治於今不老有一蒼吳道士名杜勝

到臣州採藥臣遂呼道士至舍說臣專妻病狀于

時道士昂與臣藥方用治万病無不得老

紫莞二分 吳茱萸二分 石菖蒲二分 厚朴二分

桔梗二分 皂莢二分 馬頭十分 伏苓二分

桂心二分 干薑二分 黃連二分 蜀椒二分

巴豆二分 人參二分 燕胡二分

右十五味搗下篩為散用好蜜和更搗三千杵丸

知梧子大脹二丸不知稍增可至五丸以為度當下心

腹積聚久癥瘕塊大女坏梳黃疸宿食朝起臨吐

四支痛上氣持腹脹心堅結衝心傷攻兩脇散背連

桔梗二分

皂莢二分

馬頭十分

伏苓二分

桂心二分

干薑二分

黃連二分

蜀椒二分

巴豆二分

人參二分

其胡二分

右十五味搗下篩為散用好蜜和更搗三千杵丸

知梧子大脹二九不知稍增可至五九以為度當下心

腹積聚久瘕瘕塊大女坏梳黃疸宿食朝起臨吐

四支痛上氣時腹脹心堅結衝心傷攻兩脇徹背連

胸痛無常發繞吞痛狀如虫鑽又治十種水病八種

及胃吐逆飲食噎塞或五林之病或九種心痛亦治積

羊飲食不消化或治婦人不產及新緒多年天治世

種乍寒乍熱治一切諸風體如頑癩不知痛處半為

疼痛或眼中生淚或如錐刀所刺翳膜墮落或面上

瘡如虫行莫不見或手足煩熱或夜卧不安治

七十種風又治世種瘡或大人顛小兒廿五種驚癇

又治五耶夢鬼相通或四支沉重不能飲食昏嘿

口欲取死或老或劇似真鬼還終日憂愁

情中不樂或恐或懼悲啼飲食無味婦人月水不調

或多或少似懷妊知子或連年累月羸瘦困

弊遂致於死或笑或歌為鬼所亂但能服此藥莫不

除愈巨知驗合藥與婦人服之十日出瘕瘕出長尺尋

一枚下膿三升其病即愈巨見被墮傷臨死有積血

天陰即發羸瘦者床不能食飲命在旦夕服此藥

日五九至十五日當下雞肝黑血如手指者二百片白膿二

升赤黃水升病即愈平安狀如常主薄陳勝累有

心腹脹滿經十四年瘦瘵氣同飲食不下巨與此藥

服十日下青虫六十枚大小如樹葉頭赤虫身黑下膿

一枚下膿三升其病即愈臣見被墮傷臨死有積五

天陰即發羸瘦者床不能食飲命在旦夕服此藥

日五丸至十五日當下雞肝黑血如手指者二百片白膿二

升赤黃水一升病即愈平安狀如常主薄陳勝累有

心腹脹滿經十四年瘦疲氣同飲食不下臣與此藥

服十日下青虫六十枚大小如樹葉頭赤虫身黑下膿

三升許病即愈臣公曹當患著床以經數年服此

藥廿日下完蟻蜋百枚有出青黃水一斗病即愈

臣門師姪長安羸瘦者床食便吐出命在朝夕

從臣求藥服五丸至十五日下出完蟻蜋十枚青水

一斗其病即愈臣家內有人當患心病發無時節

發即欲死服此藥五六日下完蛇二枚各長尺五寸有頭

眼未有童子班有文其病即愈臣治尼專得大風肩

墮落已經二年遍身出瘡狀如錐刀所刺與藥服九丸至

一月日出瘡虫五色凡三升許其病即愈

知故臣知方大驗死罪誅上也服中禁忌冷水生菜生菓

猪犬滑陳臭物五辛 僧深方云消石大丸治

十二瘕及婦人帶下絕產無子及欲服寒食藥而腹中有

瘕瘕僻實者當先服消石大丸下之此丸不下水穀俱下

病耳不令人極也 河西大黃八兩 朴消六兩

上黨人參二兩 甘草三兩 凡四物皆各異搗下篩

以三歲好苦酒量銅器中以竹箸拄銅器中一升作一列

凡三列以量太光內大黃使微沸盡一列乃內餘藥復盡

一列餘有一列極微火便可丸乃令如鴨子中黃

欲合藥當先吞或一宿勿令小兒婦女奴婢見也

欲服者二丸若不能服大丸可分作四丸不過四丸藥

丸欲大欲細能不分文善若人羸者可小食強者不須

上黨人參二兩 甘草三兩 凡四物皆各異搗下篩

以三歲好苦酒量銅器中以竹箸拄銅器中一斗作一列

凡三列以量太光內大黃使微沸盡一列乃內餘藥復盡

一列餘有一列極微火便可丸乃令如鴨子中黃

欲合藥當先吞或一宿勿令小兒婦女奴婢見也

欲服者二丸若不能服大丸可分作四丸不過四丸藥

丸欲大欲令細能不分文善若人羸者可小食強者不須

也若婦人服下者如鷄肝如米汁心黑或半升或三

升下後慎風寒作一坏酒粥食之然後作養臍自養

如產婦法六月則有子禁生菓脂寒辛菜若服

寒食藥者如法不與餘同也

千金方治癰癥方 灸內踝後宛中隨年壯

又方灸氣海穴百壯在脊下寸半 又方柵白皮煎

合可丸服之取知病動若下減之 又公治癰癥心

下如坏食則腹滿心絞腹痛方 亭歷子二兩

大黃二兩 澤漆四兩 三味各異搗五百杵下篩

治亭歷令膏下二物散搗五百杵和以蜜服如梧子元

不知稍增以知為度 醫門方療癰癥

腹內脇下小腹脹滿痛冷即發其氣上衝心

不能飲食或欬逆氣急煩滿方 半夏十分 生薑十分

大黃十二分 損榔人十分 人參八分 吳茱萸六分

厚朴二分 桔梗八分 伏苓六分

枳殼六分 木棗十二枚 水九升煮取

三升下大黃更煮三沸分溫三服相去

八九里當利三二行

廣利方理癰癥腹脹滿堅硬如石臍皮上青脉浮

大黃十二分 損棗人十分 人參八分 吳茱萸六分

厚朴二分 桔梗八分 伏苓六分

枳殼六分 木棗十二枚 水九升 煮取

三升 下大黃更煮三沸 分溫三服 相去

八九里 當利三二行

廣利方 理癥瘕 腹脹滿 堅硬如石 臍皮上青 脈浮

越方 紫葛八分 赤芍藥六分 桔梗六分 紫

豨蠹五枚 青木香六分 水路阿梨勒皮

六分 楠李人土分 蜀大黃土枚 牽牛子四分

搏篩蜜丸 如梧子 空腹服十五丸 忌陳臭黏

賦猪宗

葛氏方 治心下有物 大如杯 不得食者 方亭歷二兩

大黃二兩 澤漆四兩 搗篩蜜丸 梧十杆 服如梧子 二日三

治暴癥方第七 病源論云 暴癥者 由藏氣虛弱 食

生冷之物 藏既本弱 不能消之 結聚成塊 卒然而起

其生無漸 名之暴癥也 桂要方 療卒暴癥 腹中

有物 堅如石 痛如刺 晝夜啼呼 不療 百日內皆死方

大黃半斤 朴消半斤 右先搗大黃為散 然

後和 朴消以蜜合 令相得 於銅器中 置湯上

煎 令可丸 之如梧子 大酒飲 任性服 廿九日 二不

加之 以知為度 今安葛氏方 朴消三兩 范汪方 有白蜜一斤半 葛氏方 治卒

暴癥 腹中有物 堅如石 痛如刺 晝夜啼呼 不治之

百日死方 取牛膝根二斤 曝合小 子以酒一斗 漬之

蜜塞器口 舉者 契灰中 溫之 令味出 先食 服五方

合至一升 以意量多少 又方 用蒺藜根 如此尤良

又方 取常陸根 搗莖之 以新布藉 腹上 以藥按

加之以知為度今安葛氏方朴浦三兩 葛氏方治卒

暴厥腹中有物堅如痛如刺晝夜啼呼不治之

百日死方 取牛膝根二斤 曝合小干以酒一斗漬之

蜜塞器口舉者契灰中溫之令味出先食服五方

合至一升以意量多少 又方用蒟蒻根二如此尤良

又方安取常陸根搗莖之以新布藉腹上以藥披

著布上以衣覆上於復易之晝夜勿息已上千金集

驗方同之又方取席杖根一升于搗酒漬飲之從少

起曰三佳此酒治癰力勝諸大藥

新錄方治暴厥堅在心脇下欬逆不下食或下不斷

方 吳茱萸三升碎之以酒和者令熱布鼠狗裹以慰

腹上冷更炒更燔用之癰當移走復逐慰

須都消心又云暴厥堅脹如石痛欲死者方取鼠壤

去黍穰二物水相和並炒逆熨病上取差 又方軍用

黑鼠壤去三好 又方伏龍肝如前方 又方

病在上脹諸吐藥去之病在下宜利療之

本草晉疑云搗莎草汁及乾未服之

治蛇瘕方第八

病源論云人有食蛇不消因腹内生蛇瘕也有蛇之

精液誤入飲食之內令病之其狀常苦飢而則不下

喉噎塞食至胸內即吐出其病在腹摸揣必有蛇狀謂

之蛇瘕

新錄方治人食蛇不消之蛇之精液入飲食中令人病之

腹內有蛇狀名之蛇瘕方 濃作蒜齏吸一升以上陶

土餅活蒜齏下蛇之藥非虛望之 又方鳩酸草

和名即餅字也 又方大豆紫鴉取汁脹一升

鴉取汁脹八合

又方大豆紫鴉取汁脹一升

喉壹寒食至胸內即吐出其病在腹摸揣其有蛇狀謂
度高白之蛇瘕
新錄方治人食蛇不消之蛇之精液入飲食中令人病之

腹內有蛇狀名之蛇瘕方
濃作蒜齏吸一升以上陶

玄并居蒜齏下蛇之藥非虛望之
文方鳩酸草
鵝取汁服八合
文方大豆紫鵝取汁服一升

又方常思草鵝服如上並頻之取老千金方治蛇瘕
方白馬毛切長分以酒服方寸匕大者自出更服方

寸匕寸中者三出更服三方寸匕小者復出不可頓
多服數人
文云治蛇瘕大黃湯方
大黃半兩

烏賊魚骨二枚皂莢六銖芒消如鷄子一升黃芩半
兩甘草太如大指一尺
六味以水六升煮之三沸去

滓內芒消適寒溫盡服之十日復莫莫作如上法欲
服之一宿勿食平旦服當下病也
文云治蛟龍病方

開皇六年有人二月八月食芹得之其病發似顛
面色青黃腹寒食強錫三升曰二吐出龍蛟有兩

頭大驗
廣濟方同之今案病源論云三月四月蛟龍子
生在芹菜上人食芹菜隨食入腹變成蛟龍治蛇

瘕方第九
病源論云瘕瘕瘕者謂腹內瘕結如瘕狀是也
有食瘕觸冷不消而生者但有食諸雜物得冷變

化而作者皆由脾胃氣虛弱而遇冷則不能消化所
致瘕之言假也謂其有形狀而推按者也
廣濟方療

蛇瘕方
白馬尿一升五合溫服之令盡老葛氏方治瘕瘕
伏在心

下午掃見頭足特轉動者
白雌鷄一隻絕食一宿
明直膏煎飯飴之取其矢無多少於銅器中燭

致瘕之言假也。謂其有形狀而推按者也。廣濟方療

蠃瘕方

白馬尿一升五合溫服之令盡老。葛氏方治蠃瘕

伏在心

下午掃見頭足特轉動者

白雌雞一隻絕食一宿

明旦膏煎飯飴之取其矢無多少於銅器中以溺

和火上熬可搗末服方寸匕日四五須消盡乃止恒飴

雞取矢老畢致雞單食

千金方治蠃瘕

方藍菜一斗搗水三升絞取汁服一升日二又方白馬尿

一斗雞子三枚取白合煮取二合空服腹之廣濟方同之

新錄方治蠃瘕團似蠃有脚能動數衝心痛者

方取蒺藜根白皮搗三升以水五六石攪絞取汁服七

八合出又方搗藍汁服七八合治瘕瘕方第十一

病源論云人有胃氣虛弱者食出瘕因為冷氣所搏

不能消之結成瘕掃之有形狀如瘕也三有飲陂湖之

水誤有小瘕入腹不羣便即生長必有形如瘕養生方

云瘕赤目作贅食之生瘕也新錄方治人食生瘕不

消又飲湖水誤小瘕入腹不羣生長名之瘕瘕方

炭火燒木炭為灰湯或酒中服方寸匕日二又方

燒瘕鱗為灰湯若水服方寸匕日二又方燒羊

久瘕細為灰末服方寸匕日二又方白馬尿服一升

又方煮橘皮湯服之又方豉汁服搗皮末方

寸匕日三

葛氏方治食瘕膈及生癰任胸中不消成瘕方

朴消如半雞子者一枚大黃一兩凡二物以酒二升

煮取一升半盡服之治肉瘕方第十一

久與細為灰末脹方寸匕日二文方白馬尿脹一升
文方煮橘皮湯脹之 文方致汁脹 橘皮末方

寸匕日三

葛氏方治食臭膈及生癰任胸中不消成癰方

朴消如半鷄子者一枚 大黃一兩 凡二物以酒二升

煮取一升半盡脹之 治肉癰方第十一

病源論云人有病而常思得一宗託又思之名為

宗癰千金方治宗癰思宗不已食託復思方 空腹

飲白馬尿三吐吐宗出之 新錄方治宗癰方 飲脹大

豆黃末一匕日二文方濃致汁服一升日二文方煮菰菜濃

汁服之

治發癰方第十二 病源論云人有因飲食內誤有

頸癰隨而入成癰胸喉間如有虫下上去來者是也

廣潘方 療發癰喉欲飲油方油一升右香澤煎炙

鉅勞貯安病人頸邊 令口鼻臨油上勿令飲及

傳鼻面並令香氣引痰取飲不得必當疲極眠睡

發癰當從口出飲油人守視之并投石灰一裹見癰

出以灰拭手投癰抽出須臾油盡即是發也 初從腹出

形如不流水中濃菜隨發長短生知之

今案千金方云凡發癰者唯欲油也 又云療胸喉間覺有癰虫

上下偏聞葱頭食香此是發虫故也油與葱頭豈邊

術二日不食張口而卧油煎葱頭以置口邊虫當漸出

徐引去之無所忌

新錄方治發癰方滿食竟使吐者是 成煎猪脂亦

消二升煮三沸一服一升日二取吐發利癰出乃以文方飲白馬

尿八合日一老心發癰令食竟便吐餘癰則不然 已上千金方

上下偏聞^{カイ}葱頭食香此是^カ發^カ出故也油與葱豉豈^カ過^カ術二日不食張口而卧油煎葱豉以^カ量^カ口邊出當漸出徐^カ引去之無^カ所忌

新錄方治^カ發^カ癰方滿食竟使^カ吐者是成^カ煎猪脂示

消二升煮三沸一服一升日二服^カ吐^カ發^カ利^カ癰出乃^カ以^カ方^カ飲白馬

尿八合日一老^カ心^カ發^カ癰令食竟便^カ吐餘癰則不然^カ已上千金方

治米^カ癰方第十三病源論云人有好^カ鹽米轉久^カ弥^カ嗜^カ鹽

之若不得米則胸中清水得米服水便^カ心米不消^カ遂生

癰結千金方治米^カ癰恒欲食米方鷄矢一升白米

五合二味合炒令米焦^カ搗末水二升預^カ脹之須^カ更^カ吐出

病^カ碎米若無米當出^カ淡^カ今案新錄方云水三升和^カ攪^カ預^カ脹之當^カ以^カ米不^カ煮更^カ脹之大良

治水^カ癰方第四病源論云水^カ癰者由^カ絡^カ否^カ逆水氣停聚在於心下

腎經又虛不能宣利洩便致令水氣結聚而成^カ形^カ癰

在於心腹之間^カ枵^カ按作水聲但欲飲而不用食遍身

虛腫是范汪方治水^カ癰病心下如數斗油囊裹水

作聲日飲二三斗不用食但欲飲久病則癰堅有^カ蝦蟆

蟄治之方草麻就成好者^カ廿枚去皮^カ杯中研^カ合^カ煎

不用^カ擣水^カ解得三合宿不食清旦一頓^カ脹盡日中許當

吐下清黃如^カ茶汁當^カ囊^カ結^カ裏^カ若病不盡却三日更增

服^カ廿枚草麻如上^カ法若病故復不盡復增十物物枚服如

上法其以盡病為限藥但去病不令人悶乱下病之後填不

可飲當五日斷飲白麋用高方已^カ神良

治食^カ癰方第十五病源論云有人卒大能食^カ乘其常分因飢^カ作生葱便火

食之仍吐^カ一宗塊^カ繞^カ畔有口其病昂^カ愈故為食^カ癰特由不

韋致此^カ友^カ果^カ成^カ癰非飲食^カ生^カ令^カ過^カ度之病也

服世枚草麻如上法。若病故復不盡復增十物物枚服如
上法其以盡病為限。藥但去病不令人悶乱。下病之後填不
可飲。當五日斷飲。白麋用高方已神良。

治食癥方第十五

病源論云有人卒大能食。求其常分因飢。作生葱便大
食之。仍吐一食塊。繞畔有口其病昂愈。故為食癥。特由不
韋致此。又暴成癥。非飲食生冷過度之病也。

廣治方療食癥方

有人一食飯七斗并半猪餅

燔並不論。因苦飢於葱中過飢。急即食生葱。須臾吐

出一食薄而圍繞。畔口無數。昂以食授之。立消盡。飯七

斗乃心吐此物。後其人食病便愈。此名食癥。無所忌。治消

癥方第十六

病源論云人有性嗜酒。飲酒既多而食穀常少。積

久漸瘦。其病遂常思酒。不得即吐。多睡不復能食。

云是胃中有虫。使之然。名為酒癥。

今案諸方無治酒癥之方。以此諸癥之方可治之。

新錄

方治諸癥方

灸旁光俞三百壯已上

又方酒若飲

服自發。凡灰

又方搗麴末酒飲。服之曰二

又方亭歷子

三升。以酒二升漬

又方搗麴末酒飲。服之曰二。又方

亭歷子三升

以酒二升漬

又方搗三日溫服。單

蓋曰二。水病證候第十七

集驗方云黃帝問

於岐伯曰。水與膚脹。腸覃石瘕。石水。何以別之。岐

伯曰。水之起也。自果上微腫如新卧起之狀。頭脈動

時欬。陰股間寒。足胫腹乃大。其水已成也。以手柔腹。隨

平而起。如裹水之狀。膚脹者。寒氣客於皮膚之間。數

然不堅。腹大身盡腫。皮厚。案其腹陷而不起。腹色不

變。數脹者。腹身皆腫大。與膚脹亦也。其色蒼黃。腹脈起

腹覃。寒氣客於少腹外。與膚氣相薄。氣不得營。因有

於岐伯曰水與膚脹腸覃石瘕石水何以別之岐

伯曰水之起也自果上微腫如新卧起之狀頸脈動

時欬陰股間寒之胫腹乃大其水已成也以手柔腹隨

平而起如裹水之狀膚脹者寒氣客於皮膚之間欬

然不緊腹大身盡腫皮厚案其腹陷而不起腹色不

變數脹者腹身皆腫大之與膚脹水也其色蒼黃腹脈起

腹覃寒氣客於少腹外與衛氣相薄氣不得營因有

所繫瘦而內著惡氣乃起息矣乃生始也大如鷄卵稍

以益大至其成也若懷子之狀久者離歲月案之則堅推

之則移月事時下石瘕生於胞中寒氣客於子門之

間寒氣不得通惡血當寫不寫血不留心日以益大狀

子如懷月子月事不以時下皆生於此如子導而下

今案石水之證無本方病源論云石水者四肢小腹獨大其

根在膀胱小品方云先從胃腫名曰石水其根在脾

辨曰近驗水病者小便皆澀或黃赤不出益入經絡致

令腫滿名為水病療法以利小便藥不老則以利大便藥

則愈若目服利藥便利不可心者是死候也又云若諸皮

膚水脹者服諸葦汁湯得汗即愈須慎風冷及鹹食

宜食鯉鯉臭苑小豆不利小便物為佳

葛氏方云水病身黑唇安出死水病脈出者死千金方

云水病初起兩目上先腫如老蠶色頰頸脈動腹裏冷

脛中滿按之沒指腹中轉側有聲此其候也又云水病忌

腹上出水者一月死太忌之又云水病忌產乳音

樂房室諠戲一切臭一切寒生冷酢滑蒜粘米豆油膩用力

治大腹水腫方第十八病源論云未瘕病皆榮衛否

滋腎脾虛弱所為而大腹瘕腫者或因大病之後或積

虛勞損或新熱食竟入水自漬及浴冷水氣不散流

溢腹外三焦閉塞小便不通水氣結聚於內乃腹大而

脛中滿按之沒指腹中轉側有聲此其候也又玄水病忌

腹上出水者一月死太忌之又玄水病忌寧孝產乳音

樂房室諠戲一切臭一切寒生冷酢滑蘇結米豆油膩用力

治大腹水腫方第八病源論玄未疾病皆榮衛否

泄腎脾虛弱所為而大腹水腫者或因大病之後或積

虛勞損或新熱食竟入水自漬及浴冷水氣不散流

溢腹外三焦閉塞小便不通水氣結聚於內乃腹大而

腫面黃小腹陰下濕手足逆冷腰痛上氣欬喘煩疼故云

大腹水腫千金方治大腹水腫氣息不通命在旦夕

者方牛黃二分昆布分海藻十分牽牛子八分桂

心八分枳實三兩葶藶六兩七味別搗亭歷煎如

膏合和丸如梧子飲服十九日再稍加小便利為度

醫門方療大腹水腫通身洪滿小便澀少方海蛤

六合研如麵亭歷子十分熬伏苓六分橘皮四分郁李人四

分桑根白皮五分耳遂二分漢防己六分橘皮四分

搏節為散別搗亭歷子如指內散中蜜丸空腹飲

服七九日一當利一二行如不利加一九以利為度

忌猪宗大醋油膩鹹食新錄方治水病腹大

面腫小便澀方亭歷子一升熬紫色芒消三兩吳茱

萸三合合三種更搗加少蜜可丸搗二千杵

飲服七九日二服以小便利為度忌鹹酢老心若熱水

四支煩心胸熱悶者去茱萸効驗方治水大腹亭

歷子散方藍葉三兩大黃一兩半亭歷子二兩

凡三物治節先食消脹二方寸匕欲丸服蜜和服如大豆

目廿九小品方治水腫大豆湯方大豆三斗

水五斗煮令熟出豆澄汁更內煮酒五斗微火煎如飴

服一升漸增之合小下者婆方治人痲病四支脚腫面

飲脹七九日二服以小便利為度忌鹹酢老心若熱水

四支煩心胸熱悶者去萊菔効驗方治水大腹亭

歷子散方藍葉三兩 大黃一兩半 亭歷子二兩 煮

九三物治節先食消脹二方寸匕欲丸服蜜和服如大豆

目廿九小品方治水腫大豆湯方 大豆三斗

水五斗煮令熟出豆澄計更內養酒五升微火煎如飴

脹一升漸增之合小下者婆方治人痲病四支脚肢面

腹俱腫方 香薷一百斤以水煮之令熟去滓更煎令

如飴糖少服之當下水小便數即差

又云治人多水身重口中水出面虛越腫宜寫方

桂心一兩半 大腹槓榔三七匕搥研 生薑一兩半

三味切以水九升煮取三升分三服

下水即差

葛氏方治大腹水病方

防己甘草 亭歷 梔子 梔子三丸曰三恒將之取都消乃止 又方白茅根一大把小豆

三升水五升煮訖去茅根食豆水隨小便下 又方恒

取小豆飯并汁佳 本草經云獮豸主久水腫不

老垂死者作羹食之下水大効 槌要方療大水腫神

方白錫四兩 桂心一兩 桑根六升 甘草一兩 人參一兩

細辛一兩 大棗十四枚 右以水九升煮桑根取三升以煮藥

取一升去滓內錫令洋盡分三服一日一夜小便五六升是

龍門方療腹滿如石積年不損方 取白楊樹東南

皮去蒼蘚風細押削五升煮令黃酒五升熱淋訖以絹

代衣盛滓還內此酒中密封再宿服 灸水病法小品方云

灸臍俞百壯三報 灸脾俞百壯 灸意俞

百壯 在當脊九 治通身水腫方第十九

細辛一兩 大棗十四枚 右以水九升煮棗根取三升以煮藥

取一升去滓內錫令洋盡分三服一日一夜小便五六升是

龍門方療腹滿如石積年不損方 取白楊樹東南

皮去蒼護風細押削五升煮令黃酒五升熱淋訖即以絹

代衣盛滓還內此酒中密封再宿服 灸水病法小品方云

灸臍俞百壯三報

在第七椎下 兩旁寸半

灸脾俞百壯

在十一椎下 兩旁寸半

灸意俞

百壯

在當脊九 中央是也

治通身水腫方第十九

病源論云床病者由腎脾俱虛故也腎虛不能宣通水

氣脾虛又不能制水故水氣盈溢添液皮膚流遍四肢所

以通身腫也僧深方治通身水腫大小便不利方

常陸根三升

赤小豆一斗凡二物水一斛煮取一斗稍飲汁食豆以小

便利為度又云治大水面目身體年足皆腫方 大戟分

耳歷三分

煮桑一分葱花一分凡四物治下節以小麥粥服

方寸匕良効 范汪方治身體流腫心下脹滿經氣逆客

飲食方 大豆一斗以水三斗煮之令得一斗七升去滓內斗

好酒合煎之令得一斗七升服一升日三服心方馬肺湯治一身

面目浮腫方

未耳歷彈丸

大棗廿枚

水三升煮棗

取汁一升半去棗內耳歷煮取一升頓服之得至五服若

帶水氣者先服青龍湯一劑乃服之

今案醫門方耳歷子兩 煮大棗廿枚水一斗云

張仲景方青龍湯四治文疼痛面目肘腫方 麻黃半斤

去節

細辛二兩

干薑二兩 半夏二兩

凡四物切以水八升

煮得二升服之 又云治脾胃水面目手足之肘腫胃管堅大

滿極氣不能動搖棗根白皮湯方 棗根白皮切二升桂

一尺生薑三顆 人參一兩 凡四物切以水三斗煮取棗根湯

得一斗絞去滓內桂人參生薑黃飴十兩煮之得七升服一

升消息更服

今案本草桂人 重半兩云

醫方療遍身腫脹小便澀方

去水... 二水... 千薑二水... 半夏二水... 凡四物... 以水八升

者得二升... 脹心... 又云治脾胃水面目手足之腫... 胃管堅大

滿極氣不能動... 搖索根白皮湯方... 索根白皮切二升桂

一尺生薑三顆... 人參一兩... 凡四物切以水三斗者取索根竭

得一斗... 絞去滓內桂人參生薑黃飴十兩... 煮之得七升服一

升... 消息更服... 今案本草桂人

醫方... 療遍身腫脹小便澀方

高麗子二兩... 勢擣如泥... 大棗廿枚... 玄核

水一大斗... 煮取一小升... 絞去滓內高

麗子於棗中... 以微火攪... 勿停手可丸

上丸如梧子... 空腹頓服... 今盡當利二三行

凡分二服... 六分

治十水腫方第廿

病源論云十水者青水赤水黃水白水黑水懸水風

水石水裏水氣水也青水者先從面目腫遍一身其

其在肝赤水者先從心腫其根在心黃水者先從腹腫其

根在脾白水者先從肺腫其根在肺黑水者先從

足跌腫其根在腎懸水者先從面腫至足其根在臍

水者先從四支起腹滿大目盡腫其根在胃石水者由支

小腹腫獨大其根在膀胱裏水者先腹滿其根在小腸

氣水者下盛下虛下未下去其根在大腸皆由榮衛否

滯三腫不調府虛弱所生並令身體虛腫喘息上氣小

便黃也... 今案諸方十水之名各不同... 小品方十水丸治水腫方

腫從頭起名為泉其根在肺... 肺目主之腫從胸起

名為黃水其根在脾... 甘遂主之腫從面起名為青

水其根在肝... 大戟主之腫從腹起名為氣水下實下

虛其根在腸... 芫花主之腫從股起名為黑水其根在

腎... 玄參主之腫從面起至足名為懸水其根在臍

亦

三腫不調府虛弱所生並令身體虛腫喘息上氣小

便黃今案諸方十水之名各不同主治之藥以異小方十水丸治水腫方

腫從頭起名為泉其根在肺肺目主之腫從胸起

名為黃水其根在脾甘遂主之腫從面起名為青

水其根在肝大戟主之腫從腹起名為氣水下實下

虛其根在腸芫花主之腫從股起名為黑水其根在

腎玄參主之腫從面起至足名為懸水其根在膽赤

小豆主之腫從內起堅塊四支腫名為石水其根在膀胱

素根主之腫從四支起腹腫名為風水其根在胃澤

漆主之腫從腹起名為冷水其根在小腹巴豆主之腫

從胸中起名為赤水其根在心亭慄主之右十種隨其

病始所在增其所主藥一分巴豆四分去心皮治未合下

篩蜜丸脹如梧子三丸得下為度不下日三三可作

散未食脹半錢上大便利明朝復脹如法再服病愈

即禁飲食但得食于莫可又云十水散治水腫方先從

脚腫名曰清水其根在心亭慄主之先從陰腫名曰紫

水其根在腎澤漆已之先從腹名曰冷水其根在大腸蜀

椒主之先從面目腫名曰氣水其根在肺素根主

之先從手足腫名曰心水其根在小腹巴豆主之先從口脣

腫名曰黃水其根在胃大戟主之先從脇腫名曰飲水其

根在肝芫花主之先從腰腫名曰肝水其根在肝甘

遂主之先從胸腫名曰石水其根在脾伏苓主之先從

從背腫名曰鬼水其根在膽雄黃主之右十物分等

主十水隨腫所從始案方偏加藥二分合搗下篩空腹

以水服方寸匕當下水多者減脹下少者益之范汪方

治十水丸方第一之水從先從面目腫遍一身名曰青

根在肝菟花主之 先後腰腫名曰肝水其根在肝甘

遂主之先後胸腫名曰石水其根在脾伏苓主之先後

從背腫名曰鬼水其根在膽雄黃主之 右十物分等

主十水隨腫所從始案方偏加藥二分合搗下篩空腹

以水服方寸匕當下水多者減服下少者益之 范汪方

治十水丸方 第一之水從先從面目腫遍一身名曰青

水其根在肝大戟主之 第二之水先從心腫名曰

赤水其根在心亭子主之 第三之水先從腹腫名曰

黃水其根在脾甘遂主之 第四之水先從脚腫名曰白

水其根在肺葶藶主之 第五之水先從足腫名曰

黑水其根在腎連翹主之 第六之水先從面腫至三眉

玄水其根在膽芫華主之 第七之水先從四支起腫滿

大人身盡腫名曰風水其根在胃澤漆主之第八之水四支其

腹腫獨大名曰石水其根在旁光素根白皮主之

第九之水從腸滿名曰果水其根在小腸巴豆主之

第十之水乍盛乍虛下去名曰氣水其根在大腸赤

小豆主之 凡十病藥皆主之分等所病形同倍之治合白

蜜丸如小豆先食服一九曰三飲下病服三九人弱者以音詳

之治宿食流飲寒熱濕病禁辛菜嗜寒生臭不禁就之

僧深方治身體浮腫十水散方 芫花三分 決明三分

大戟三分 石韋三分 巴豆三分 澤瀉三分 大黃三分

鬼臼三分 甘遂三分 亭脂三分 凡十物治下 葭以大米

粥清汁服方寸匕日三 治風水腫方第廿一

病源論云脾胃虛不能制於水故水散溢皮膚又

與風濕相搏故云風水也令人身浮腫如累水之狀按

腫上凹而不起骨節疼痛而惡風是也

大戟三分 ハヤヒトクモ 石膏三分 イソハハ 巴豆三分 オホハ 澤瀉三分 サハハ 大黃三分 オホハ

鬼臼三分 スグア 甘遂三分 オヒソ 亭歷三分 ハタタカ 凡十物治下 ナニトモナニ 葭以大麦

粥清計服方寸匕三 ルル 治風水腫方第廿一

病源論云脾胃虛不能制於水故水散溢皮膚又

與風濕相搏故云風水也令人身浮腫如累水之狀按

腫上凹而不起骨節疼痛而惡風是也

小品方葱豆洗湯治虛熱及石熱當風露卧冷濕傷脫

熱蘊在裏變成熱風水病心腹腫滿氣急不得下頭小

便不利六便難出交腫如皮囊盛水晃如老蠶色瘰癧

腫如斗莖腫生瘡如死鼠此皆虛損腎中有熱強取風冷濕

損脾胃故也內依方服諸利水藥外宜以此湯洗四支竟以

葱損脾胃故也內依方服諸利水藥外宜以此湯洗四支竟

膏傳之別以猪蹄湯洗陰莖創爛處及疔腫也

葱合青白切一升蔕梨子一升春碎 赤小豆一升 菰菜

子一升春碎 蒲葦切五升 巴豆一百枚合心皮打碎

右六物以水一石二斗煮取八斗以淋洗身腫處葱豉膏猪

蹄湯方在本方又云亭歷子迴神酒治風水通身洪腫斗

宗如裂者服之小便利自隨消方 春時釀清酒五斗

一方五升亭歷子三升煮著酒中漬再宿便服一合以

漸增之病去小便利腫自消滅皮縮也神良有驗若不能

得春酒餘糧好酒亦佳 槎要方治風水毒氣通身

腫方 猪白皮三兩 桑根白皮五兩 橘皮一兩

紫蘘二兩 生薑四兩 大豆三升 右以水九升者取

一大升分四服三劑百日内忌鹹醋 經心方治風水大豆

煎生桑根白皮細切三升入土一尺者大豆一斗二味以水

六斗煮取一斗去滓下生薑汁二升更煎取四升分五合

第一服曰三夜一以知為度又云牽牛丸治脚腫滿步行

得春酒餘糧好酒各佳 槎要方治風水毒氣通身

腫方 猪白皮三兩 棠根白皮五兩 橘皮一兩

紫蘗二兩 生薑四兩 大豆三升 右以水九升者取

一大升分四服三劑百日内忌鹹醋 經心方治風水大豆

剪生棠根白皮細切三升入土一尺者大豆一斗二味以水

六斗煮取一斗去滓下生薑汁二升更煎取四升分五合

第一服日三夜一以知為度 又玄牽牛丸治腳腫滿步行

不能眾惡毒水腫方 大黃二兩 朴消三兩 熬 牽牛子

七兩 熬 桃人二兩 去令 于薑二兩半 人參二兩 橘皮兩半

右七物搗下篩以蜜和春万杵服如梧子廿丸以微利為

度腫中心不羣盡劑之者可毒万病廿八種風邪志愈

用甚驗禁冷水猪宗 僧深方治風水腫癰癰當

陸酒方 常陸根一升切凡一物以淳二斗漬三宿服

一升當下者減從半升起日三不堪酒者以意減之

又玄治通身腫皆是風虛水氣三治暴腫痛蒲黃酒方

蒲黃一升 小豆一升 大豆一升 凡三物清酒一斗煮三升

分三服 耆婆方治人風水氣面俱腫上氣腹脹不能

食羸弱在床 經時不羣者方 小豆三升 大麻子三升

搗碎以水研汁 棠根白皮一斤合煮一豆熟食豆飯汁

即大下水身老 藥敬本草注者點臭食之主水浮

腫又方脹鴨肪食鴨頭主之水腫 又方棠灰汁煮大豆

飲之下水腫 治疥癬方第廿二

病源論云疥癬由飲水漿不消水氣結聚而成癰在肘

脇之側轉動便痛不耐風寒不欲食而短氣是以癰者

者謂癰側在於脇間故受名焉 効驗方云可服諸下

藥寫之 玄感方灸挾脊兩旁各廿壯 又方灸兩乳下

一夫助間二穴 新錄方杏人作煎或作丸酒服如來日三

腫又方脹鴨肪食鴨頭主之水腫 又方桑灰汁煮大豆
飲之下水腫 治疥癬方第廿二

病源論云疥癬由飲水漿不消水氣結聚而成癬在肌肉
腸之側轉動便痛不耐風寒不欲食而短氣是以癬者

者謂癬側在於脇間故受名焉 効驗方云可服諸下
藥寫之 玄感方灸掖脊兩旁各廿壯 又方灸兩乳下

一夫助間二穴 新錄方杏人作煎或作丸酒服如來日三
又方灸桃人椎上 又方單熬大麥蘖為散服如土

本草經水研草麻子廿枚服吐惡沫也
治身面卒腫方第廿三 病源論云身面卒洪腫者

三床病之候也脾虛不能制水故水流溢散於皮膚
令身體卒然洪腫 范汪方治卒腫大戟洗湯方

大戟四兩 莽草二兩 茵芋二兩 大黃二兩 黃連二兩
芒消二兩 亭歷二兩 皂莢二兩 凡八物皆咬咀以一斗

五升煮得一斗絞去滓洗腫上日三 又云治諸卒腫
風掣痛方 朱芥子溫湯和塗帛上以括棊復易

不堪其痛契者小塗之已試良 僧深方治暴腫方
破鷄子攪令其黃白塗腫上燂復塗太良

又方大豆牙熱煮飲汁食豆不過三升良
落手方治暴腫方 持亭歷子薄之兩三過昂消葛

葛氏方治卒腫身面皆洪大方凡此腫或是虛氣或
是風冷氣或是水飲氣此方皆治之 用大鯉魚一頭以

淳苦酒三升煮之令苦酒盡乃食莫勿食飯及塩豉他
雜也不過再作便愈 又方大豆一升熟煮流飲汁食豆不

過三作必愈小豆三佳 又方大豆一斗以水五斗煮取二斗去豆
內酒八升更煎取九升分三四服腫老後渴煩不可多飲

又方灸足內踝下白肉際三壯 又云治腫入腹若滿急安飲食方
事歷七兩 枳目三兩 伏苓二兩 吳茱萸二兩 搗蜜丸 如梧子

是風於氣或是水飲氣此方皆治之 用大鯉魚一頭以

淳苦酒三升煮之令苦酒盡乃食其勿食飯及塩豉他

雞也不過再作便愈 又方大豆一升熟煮流飲汁食豆不

過三作必愈小豆三佳 又方大豆一斗以水五斗煮取二斗去豆

內酒八升更煎取九升分三四服腫老後渴煩不可多飲

又方灸足內踝下白肉際三壯又治腫入腹若滿急安飲食方

事歷七兩 枳目三兩 伏苓二兩 吳茱萸二兩 枳實九 如梧子

脹十九日三又方大戟 烏扇木各二兩 枳實九 如梧子旦服

二九當下 又方若腫從脚起稍上進者入腹則致人治之方

生豬肝一具細切頓食勿与塩乃可用苦酒可 又方煮豉汁

飲之以滓薄脚 治犯土腫方第廿四

病源論云犯土之病由居住之處穿鑿地土犯觸土氣而致

病也令人之肌空頭面遍體盡氣急也謂之犯土新錄方

云以水脹伏龍肝方寸匕此主犯土上氣魚腫大好本草拾遺云

藥有同類相伏者不伏水土脹去以此案之以鼠壤土垂麩

腫上可善 治黃疸方第廿五

病源論云黃疸之病此由酒食過度府藏不和水穀相并

積於脾胃傷為風濕所搏痰結不散熱氣鬱滯故食

如飢令身體面目血甲及小便盡黃而欲安卧若渴而疸

者其病難治疸而不渴其病可治發於陰部其人

必臨發於陽部其人 葛氏方云黃病有五種謂

黃汗黃疸穀疸酒疸勞疸也又云治黃疸一身

面目悉黃如橘方 生第根一把細切以猪膏一升合作

養盡食 今案范汪方治年 又方搗生麥苗水和絞取汁服三

升小麥勝大麥 今案范汪 范汪方治黃疸茵陳湯方茵

陳蒿六兩 大黃二兩 艾子十四枚 凡三物水一斗二升先煮

郭其人振寒而發熱也 葛氏方云黃病有五種謂

黃汗黃疸穀疸酒疸勞疸也又云治黃疸一身

面目悉黃如橘方 生第根一把細切以猪鬃一升合作

養盡食 今案范汪方治年六十以上一服愈 又方搗生麥苗水和絞取汁服三

升小麥勝大麥 今案范汪方不和水 范汪方治黃疸茵陳湯方茵

陳蒿六兩 大黃二兩 文子十四枚 凡三物水一斗二升先煮

茵陳蒿減六升去滓內大黃文子者取三升分三服之

小品方治黃疸身目皆黃皮膚起瘰出三物茵陳湯方

茵陳蒿一把 文子十四枚 石膏一斤凡三物以水八升煮

取二升半去滓石膏一斤猛火燒令赤投湯中沸定

清取汁適寒溫服一升汗出乃愈 千金方治黃疸

身體面目皆黃三黃散方 大黃四分 黃連四兩 黃芩四兩三

味末先食服方寸匕三 今案范汪方凡如梧子服十九又本草拾遺云藥有同類伏者身黃服黃物

錄驗方治黃疸大小便不利面赤汗自出此為表虛裏

實大黃湯方 大黃四兩 茵陳四兩 文子十五枚

消石四兩 凡四物切以水一斗煮得二升半去滓內消石復

煎之得二升分再服得快下乃愈 又方蕪菁子五升

末服方寸匕三

醫門方療黃病身體面目悉黃如橘由暴熱外發迫

之熱因流入胃中所致方文子人三兩 栝樓二兩 苦參二兩

龍膽三兩 大黃三兩 構節蜜丸飲服廿九日三加至五六十丸

廣濟方療五種黃方 丁香七枚 依蒂七枚 赤小豆七枚

為散取暖水一雞子許和一錢七服之忌諸熱食

經心方治黃疸單方 搗把合小麥煮勿令腹破熟而已曰食永

枕中方治人黃病垂死者服鐵漿一升即愈 灸黃疸法

之生因流入胃中而到方文子人三未極極二未老為二而
龍膽三兩 大黃三兩 梔子 蜜丸 飲服廿九日 三加至五六十丸

廣洛方療五種黃方 丁香七枚 依蒂七枚 赤小豆七枚

為散取暖水一鷄子許和一錢七服之忌諸熱食

經心方治黃疸單方 搗把合小麦煮勿令腹破熟而已曰食永

枕中方治人黃病垂死者服鐵漿一升即愈 黃疸法

葛氏方灸脾俞百壯 穴在第十一椎下 灸方灸手大陰隨年壯 穴在手

又方灸錢孔百壯 穴度乳至脊中屈筋頭骨是 又方灸胃管百壯

穴在鴛尾脊中已上 范汪方灸脊上下兩邊各一寸半二百壯

千金方小品方同之 治黃疸六十以上 僧深方灸第七椎上下 主廣汗 又方屈手大指

各節上理各七主 又方灸脊中推七主 經心方灸兩季心

各七壯 僧深方同之 今案可服可梨勒丸紫雪紅雪等

治黃汗方第廿六

病源論云黃汗之病身體洪腫發熱汗出不渴狀如風

水汗染衣心黃如麋計此由脾胃有熱汗出而入水中若浴

水入汗孔得之 醫門方療黃汗之病狀如風水其

脈沉遲皮膚冷手足微厥面目四支皮膚皆腫胸中

滿方夕藥八兩桂心三兩 黃耆五兩 苦酒五合 以水七升

煮取三升飲一升心當煩勿恠至六七日即差 今案葛氏方夕藥

方苦酒二升 治穀疸方第廿七 病源論云穀疸之狀食畢

心動不安而發黃由失飢大食胃氣衝煙所致

眩心拂鬱不安而發黃由失飢大食胃氣衝煙所致

葛氏方治穀疸方茵陳蒿四兩水一斗煮得六升去滓內

大黃二兩文子二七枚煮取二升分三服當去黃汁 僧深方

治穀疸發寒熱不可食即頭眩心中拂胃不安天茵

陳湯方茵陳蒿二兩黃蘗二兩大黃一兩甘草一兩人參一

兩文子十四枚黃連一兩 凡七物切水一斗煮得三升分三服

心動不安而發黃由失飢大食胃氣衝煙所致
眩心拂鬱不安而發黃由失飢大食胃氣衝煙所致

葛氏方治穀疸方茵陳蒿四兩水一斗煮得六升去滓內

大黃二兩文子二七枚煮取二升分三服當去黃汁僧深方

治穀疸發寒熱不可食即頭眩心中拂胃不安天茵

陳湯方茵陳蒿二兩黃蘗二兩大黃一兩甘草一兩人參

兩文子十四枚黃連一兩凡七物切水一斗煮得三升分三服

治酒疸方第七八

病源論云夫虛勞人若飲酒多進穀少者則胃內生熱

因大醉當風入水則身自發黃心中懊痛足脛滿小便

黃面發赤斑若下之久變為黑疸面目黑心中如噉

蒜廔狀大便正黑皮膚紅之不仁其脈浮弱故知之酒

疸心中熱欲噓者當吐之即愈其人必小便不利其後

當心中熱足下熱是其候明也

千金方治飲酒食少飲酒澀結發黃疸心中懊懣

而不甚熱或于臨枳實大黃湯下之方枳實九枚

大黃二兩豆豉半升文子十枚右四味以水六升

煮取二升分三服今案葛氏方大黃一兩枳實五枚文子七枚發赤

得黃病方

藤生麥以井華水絞取汁煩脹三升先食

日三有驗

僧深方治酒疸方

生艾葉一杷麻黃二兩大黃六分大豆一杷

凡四物清酒三升煮二升分三服艾葉無生用

干半杷

治女勞疸方第七九

病源論云女勞疸之狀身目皆黃發熱惡寒少腹滿

僧深方治消疸方

生艾葉一杷

麻黃二兩

大黃六分

大豆一杷

凡四物清消三杷煮二升分三服

艾葉無生用

干半杷

治女勞疸方第廿九

病源論云女勞疸之狀身目皆黃發熱惡寒少腹滿

急小便難由大熱而交接竟入水所致

千金方云黃疸日晡發熱惡寒少腹急體黃顏黑大

便澀黑足心熱此為女勞也腹滿者難治之方消

滑石石膏各二味分等治以大麥粥汁脹方

寸匕白三小便極利

今案葛氏方有消石石品方有右膏無禁石范注方有禁石無石膏

醫門方療女勞黃穀黃方

苦參四兩

龍膽三兩

艾子五兩艾子搗篩為散以猪膽汁和如梧子以飲脹丸

范曰三治黑疸方第卅

病源論云黑疸之狀若小腹滿身體盡黃額上黑足

下熱大便黑是也夫黃疸消疸女勞疸久多變為

黑疸

葛氏方治黑疸者多死急治之方

玄休根根絞取汁頓服一升至三時須病當隨小便去不

去更服之

今案范注方云黑疸甚困醫所不治之立愈